

# Acer x freemanii 'Jeffersred'

## Freemanii-Ahorn



### SAISONFARBEN



### PFLANZENTYPEN

**Baumarten:** hochstämmige Bäume, Stammbüsche, mehrstämmige Bäume, Klima-Bäume, Schattenbäume | **Formbäume mit Stamm:** Kasten/Block, mehrstämmige Schirmform

### VERWENDUNG

**Ort:** Straße, Allee, Platz, Park, Grünstreifen, Töpfe / Container, Dachgarten, großer Garten, Friedhof, Verkehr, Industrieflächen | **Bodenversiegelung:** keine, offen, dicht | **Bepflanzungskonzepte:** Klimabepflanzung, Präriebepflanzung

### EIGENSCHAFTEN

**Kronenform:** breit, eirund | **Kronenstruktur:** geschlossen | **Höhe:** 12 - 17 m | **Breite:** 9 - 12 m | **Winterhärtezone:** 4A - 9B

### STANDORT

**Windfestigkeit:** verträgt stärkeren Wind | **Bodentypen:** Löss, Ton, Torfboden, schwerer Kleiboden, leichter Kleiboden, sandiger Boden, lehmiger Boden, alle Bodentypen | **Nährstoffgehalt:** einigermaßen nährstoffreich, nährstoffreich | **Bodenfeuchtigkeit:** trocken, feucht, nass | **Lichtbedürfnis:** Sonne, Halbschatten | **pH-Wert:** sauer, neutral, basisch | **Wirtspflanze/Futterpflanze:** Bienen, Schmetterlinge | **Extreme Umgebungen:** verträgt Trockenheit, verträgt Luftverschmutzung, verträgt Hitze

### PLANTKENMERKEN

**Blüten:** Blütenrispen, diskret | **Blütenfarbe:** Gelbgrün | **Blütezeit:** März - April | **Blattfarbe:** Bronze austreibend, helles Grün, Unterseite graugrün | **Blatt:** laubabwerfend, handförmig, dick, gegenüberstehend, doppelt gesägt, gelappt | **Herbstfärbung:** Rotorange, Scharlach | **Frucht:** selten Früchte, geflügelt | **Fruchtfarbe:** Gelbbraun, Grün | **Rindenfarbe:** Graubraun | **Rinden:** furchig | **Zweigefarbe:** Rotbraun | **Zweige:** gestreift, mit Lentizellen | **Wurzelsystem:** tiefgehend, flach, feine Wurzeln