

Acer x freemanii 'Armstrong'

Érable de Freeman 'Armstrong'



TYPES DE PLANTES

Types d'arbres: arbres haute tige

UTILISATION

Lieu: rue, avenue, place, parc, ceinture de verdure, bacs/conteneurs, jardin de toiture, grand jardin, cimetière, trafic, zone industrielle | **Pavage:** sans, ouvert, fermé | **Concepts de végétation:** Végétation de prairie

PROPRIÉTÉS

Forme de la couronne: fastigiée | **Structure du houppier:** fermée | **hauteur:** 10 - 15 m | **largeur:** 5 - 7 m | **zone de rusticité:** 4B - 9B

CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN

Vent: tolère le vent | **Type de sol:** loess, sol argileux sablonneux, sol tourbeux, argileux, argilo-sableux, sableux, sol limoneux, tous types de sols | **Matières organiques:** normal, riche en humus | **Humidité du sol:** sec, légèrement humide, humide | **Exposition:** soleil, mi-ombre | **pH:** acide, neutre (5.1 - 7.0) | **Plante hôte/plante nourricière:** abeilles, papillons | **Environnements extrêmes:** tolère la sécheresse, supporte la pollution atmosphérique

PLANTKENMERKEN

Fleurs: corymbe, frappante, pendante | **Couleur des fleurs:** orange-rouge | **Floraison:** mars - avril | **Couleur des feuilles:** vert, dessous gris | **Feuilles:** à feuilles caduques, palmatilobée, grande, opposée, laciniée, serretée | **Couleur automnale:** orange-rouge | **Fruits:** pas de fruits | **Couleur du tronc:** gris | **Tronc:** peu cannelée | **Couleur des rameaux:** gris-marron | **Rameaux:** nu | **Système racinaire:** profond, superficiel, étendu, finement ramifié, racines fines

