


Acer triflorum

klon trójkwiatowy



KOLORY SEZONOWE



TYP NASADZEŃ

rodzaje drzew: drzewa wielopniowe, krzewy soliterowe | **Topiary na pniu:** wielopniowa parasolowata

ZASTOSOWANIE

Lokalizacja: park, pas zieleni, ogród na dachu, duży ogród, cmentarz | **Chodnik:** brak | **Koncept nasadzeń:** Nasadzenia tåkowe

CECHY

Kształt korony: kulista | **Struktura korony:** półotwarta | **Wysokość:** 5 - 8 m | **Szerokość:** 5 - 8 m | **Strefa mrozoodporności:** 5A - 7B

WYMAGANIA

Wiatr: odporne na wiatr | **Gleba:** less, glina piaszczysta, lekka glina, gleba piaszczysta, gleba ilasta | **Stopień uźynienia:** średnio zasobna w składniki odżywcze, zasobna w składniki odżywcze | **Poziom nawodnienia gleby:** wilgotna | **Stanowisko:** słoneczne, półcieniste | **Odczyn gleby:** kwaśny, obojętny (6.1 - 7.5) | **Rośliny pożyteczne:** pszczoły, motyle | **Ekstremalne warunki:** tolerancja na suszę

PLANTKENMERKEN

Kwiaty: baldachogrona, niepozorne, małe | **Kolor kwiatów:** żółtozielony | **Termin kwitnienia:** kwiecień - kwiecień | **Kolor liści:** zielony, spodem niebieskozielony | **Liście:** opadające zimą, lancetowate, naprzeciwległe, owłosione, piłkowane, trójdzielne | **Kolor jesienią:** pomarańczowoczerwony | **Owoce:** skrzydlate, torebki | **Kolor owoców:** zielony | **Kolor kory:** cynamonowobrązowy, szary | **Kora:** łuszcząca się, brudowana, korkowata | **Kolor pędów:** brązowy | **Pędy:** nagie | **System korzeniowy:** płytki, korzenie boczne