



Aesculus pavia var. *discolor* kasztanowiec krwisty odm. discolor



TYP NASADZEŃ

rodzaje drzew: drzewa pienne, drzewa półpienne

ZASTOSOWANIE

Lokalizacja: park, pas zieleni, duży ogród, cmentarz | **Chodnik:** brak

CECHY

Kształt korony: kulista | **Struktura korony:** zwarta | **Wysokość:** 7 - 10 m | **Szerokość:** 5 - 9 m | **Strefa mrozoodporności:** 6B - 8B

WYMAGANIA

Wiatr: nieodporne na wiatr | **Gleba:** less, glina piaszczysta, gleba torfiasta, lekka glina, gleba piaszczysta, gleba ilasta | **Stopień użyczenia:** średnio zasobna w składniki odżywcze, zasobna w składniki odżywcze | **Poziom nawodnienia gleby:** wilgotna, mokra | **Stanowisko:** słoneczne, półcieniste, zacienione | **Odczyn gleby:** kwaśny, obojętny (6.1 - 7.5) | **Rośliny pożyteczne:** pszczoły, motyle | **Ekstremalne warunki:** bez zarażeń chorobą krwawienia

PLANTKENMERKEN

Kwiaty: wiechy, efektowne, stojące, duże | **Kolor kwiatów:** żółtoczerwony | **Termin kwitnienia:** czerwiec - czerwiec | **Kolor liści:** ciemnozielony, spodem filcowatobiały | **Liście:** opadające zimą, odwrotnie jajowate, duże, matowe, spodem owłosione, piłkowane, złożone | **Owoce:** efektowne, sporadycznie owocuje, w łupinie | **Kolor owoców:** jasnobrązowy | **Kolor kory:** brązowy | **Kora:** gładka | **Kolor pędów:** brązowy | **Pędy:** owłosione | **System korzeniowy:** rozległy, korzenie boczne, zdrewniałe korzenie, korzeń palowy

