

# *Davidia involucrata* var. *vilmoriniana* dawidia chińska odm. vilmoriniana



## TYP NASADZEŃ

**rodzaje drzew:** drzewa pienne, drzewa wielopniowe, drzewa charakterystyczne, krzewy soliterowe

## ZASTOSOWANIE

**Lokalizacja:** park, pas zieleni, duży ogród, cmentarz | **Chodnik:** brak

## CECHY

**Kształt korony:** kulista, szerokojawowa, szerokopiramidalna | **Struktura korony:** półotwarta | **Wysokość:** 8 - 12 m | **Szerokość:** 6 - 10 m | **Strefa mrozoodporności:** 7A - 9A

## WYMAGANIA

**Wiatr:** odporne na wiatr | **Gleba:** less, glina piaszczysta, lekka glina, gleba piaszczysta, gleba ilasta | **Stopień żyzności:** średnio zasobna w składniki odżywcze, zasobna w składniki odżywcze | **Poziom nawodnienia gleby:** wilgotna | **Stanowisko:** słoneczne, półcieniste | **Odczyn gleby:** kwaśny, obojętny | **Rośliny pożyteczne:** pszczoły, motyle | **Ekstremalne warunki:** tolerancja na zanieczyszczenie powietrza

## PLANTKENMERKEN

**Kwiaty:** główki, efektowne, zwisające, duże, pachnące | **Kolor kwiatów:** kremowobiały, brązowofioletowy | **Termin kwitnienia:** maj - czerwiec | **Kolor liści:** pączki brązowe, ciemnozielony, spodem jasnozielony | **Liście:** opadające zimą, sercowate, ząbkowane | **Kolor jesienią:** pomarańczowy, czerwony, fioletowy | **Owoce:** efektowne, duże, pestkowiec | **Kolor owoców:** jasnobrązowy | **Kolor kory:** jasnobrązowy, brązowy, cynamonowobrązowy | **Kora:** łuszcząca się | **Kolor pędów:** brązowy, czerwonoróżowy | **Pędy:** nagie, błyszczące | **System korzeniowy:** głęboki, średnio rozgałęziony, zdrewniałe korzenie, mięsiste korzenie

