# *Syringa vulgaris* 'Mme Lemoine'
# lilak pospolity odm. Mme Lemoine

**KOLORY SEZONOWE**

| jan | feb | mar | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TYP NASADZEń**

**rodzaje drzew**: drzewa wielopniowe, krzewy soliterowe | **Topiary na pniu**: wielopniowa parasolowata

**ZASTOSOWANIE**

**Lokalizacja**: park, pas zieleni, pojemniki, ogród na dachu, duży ogród, mały ogród, patio, cmentarz, tereny przemysłowe, obszar nadbrzeżny | **Chodnik**: brak

**CECHY**

**Kształt korony**: odwrotnie jajowata | **Struktura korony**: półotwarta | **Wysokość**: 3 - 4 m | **Szerokość**: 2 - 3 m | **Strefa mrozoodporności**: 4A - 8B

**WYMAGANIA**

**Wiatr**: odporne na wiatr, odporne na nadmorski wiatr | **Gleba**: less, glina piaszczysta, ciężka glina, lekka glina, gleba ilasta | **Stopień użynienia**: zasobna w składniki odżywcze | **Poziom nawodnienia gleby**: sucha, wilgotna | **Stanowisko**: słoneczne | **Odczyn gleby**: obojętny, zasadowy | **Rośliny pożyteczne**: motyle | **Ekstremalne warunki**: tolerancja na suszę, tolerancja na zanieczyszczenie powietrza

**PLANTKENMERKEN**

**Kwiaty**: wiechy, efektowne, stojące, pełne, silnie pachnące | **Kolor kwiatów**: biały | **Termin kwitnienia**: maj - czerwiec | **Kolor liści**: zielony | **Liście**: opadające zimą, sercowate, naprzeciwległe | **Kolor jesienią**: żółty | **Owoce**: niepozorne, torebka | **Kolor owoców**: brązowy | **Kolor kory**: szarobrązowy | **Kora**: łuszcząca się | **Kolor pędów**: jasnoszary | **Pędy**: nagie

EBBEN trees since 1862

TreeEbb